云 南 植 物 研 究 2002，24（5）：611～612
Acta Botanica Yunnanica

华南杜鹃属新资料*

高连明，李德铢**
（中国科学院昆明植物研究所，云南 昆明 650204）

New Data of *Rhododendron* from South China

GAO Lian-Ming，LI De-Zhu**
（*Kunming Institute of Botany*，*Chinese Academy of Sciences*，Kunming 650204，China）

Key words：*Rhododendron*；New variety；New records；Floral characters
关键词：杜鹃属；新变种；新记录；花部特征
中图分类号：Q 949 **文献标识码**：A **文章编号**：0253－2700(2002)05－0611－02

在对杜鹃属马银花亚属专题野外采集和整理标本的过程中，发现马银花亚属植物 2 种为地理分布新记录和 1 个新变种，并对头巾马银花 *Rhododendron mitriforme* Tam 的花部特征作了拉丁文的补充描述。

高寨长蕊杜鹃 新变种

Rhododendron stamineum Franch. var. ***gaozhaiense*** L. M. Gao，var. nov.

A typo recedit foliis majoribus，9－13 cm longis，3－5.5 cm latis，basi late cuneatis vel subrotundatis，subtus costis prope basibus brevi-setosis；petiolis 1.7－2.0 cm longis，sparsim glanduloso-setosis.

Guangxi（广西）：Xingan Xian（兴安县），Maoershan（猫儿山），Gaozhai（高寨），near the edge of the forest（林缘），alt. 800 m，2000.05.06，L. M. Gao 20085（高连明 20085）.（holotype，KUN）.

与原变种区别在于叶较大，长 9～13 cm，宽 3～5.5 cm，基部宽楔形或近圆形，叶背中脉近基部被稀疏的短刚毛；叶柄长 1.7～2.0 cm，被稀疏的腺体刚毛。

大鳞杜鹃（中国植物志） 湖广杜鹃（植物研究）

Rhododendron huguangense Tam in Bull. Bot. Res. 2（1）：98. Pl. 11. 1982；华南杜鹃花志 76，图 12. 1983（sphalm.“hukwangense”）；中国植物志 57（2）：357，图版 118：6－8. 1994.

广西：金秀，大瑶山，海拔 1 100 m，2000.05.02，高连明 20067（KUN）；同地点，老山伐木场，海拔 1 230 m，1981.09.13，大瑶山综考队 10565（IBSC & IBK）.

分布：湖南南部，生于山坡林缘。模式标本采自湖南宜章容家洞。广西为分布新记录。

头巾马银花（中国植物志） 头巾杜鹃（植物研究）

Rhododendron mitriforme Tam var. ***mitriforme*** in Bull. Bot. Res. 2（4）：91. 1982；华南杜鹃花志 67，

* 基金项目：国家杰出青年科学基金（39725001）和中国科学院百人计划项目资助
** 通讯作者 To whom correspondence should be addressed. dezhuli@hotmail. com
收稿日期：2001－10－25，2001－11－27 接受发表
作者简介：高连明（1972－）男，博士研究生，主要从事植物系统学和植物地理学研究。

111. 图 22 – 1. 1983；中国植物志 57（2）：342 – 343，图 114：5 – 6. 1994. —— *Rhododendorn xinganense* G. Z. Li in Guihaia 3（2）：83 – 85. 1983.

广东：怀集，龙兴山，1958.10.25，**刘瑛光** 2580（IBSC）.

分布：广西东南及东北部，湖南西南部。模式标本采自广西贺县。广东为分布新记录。头巾马银花花的补充描述：

Descr. fl. add.：Inflorescentia lateralis，1-flora. Pedicellus glaber，c. 1 cm longus. Calyx conspicuus，5-lobus，lobis ovatis，glabris，c. 1 cm longis，0.6 – 0.8 cm latis. Corolla rotata，subroseo-alba，5-loba，lobis obovatis vel obovato-ellipticis，apice emarginatis，2 – 2.5 cm longis，1.3 – 1.6 cm latis，glabris. Stamina 5，inaequalia，coralla leviter breviora vel eam subaequilongis，2 – 2.5 cm longis；filamentis infra media albo-puberulis，antheris ovoideis，3 mm longis. Ovarium ovoideum，3 mm longum，dense glanduloso-brevisetosum；stylus glaber，c. 3 cm longus，stigmate parvo，capitato.

花的补充描述：花单生枝顶叶腋；花梗长约 1 cm，**无毛。花萼明显，裂片** 5，**卵圆形，，长约** 1 cm，**宽** 6 ~ 8 mm，**无毛。花冠辐状，白色稍带粉红，**5 **裂，裂片倒卵状椭圆形，顶端微凹，长** 2 ~ 2.5 cm，**宽** 1.3 ~ 1.6 cm，**无毛。雄蕊** 5 **枚，不等长，稍短于花冠或与花冠近等长，花丝长** 2 ~ 2.5 cm，**下半部被白色微柔毛；花药卵圆形，长** 3 mm。**子房卵球形，长约** 3 mm，**密被具腺短刚毛；花柱光滑，长约** 3 cm，**伸出花冠外；柱头小，头状。**

广西：金秀，大瑶山，银杉保护站，山坡林缘，海拔 1 110 m，2000.05.02，**高连明** 20064（KUN）.

致谢　中科院昆明植物研究所方瑞征研究员审校全文。广西桂林植物所欧祖兰女士，广西金秀大瑶山自然保护区谭海明先生和广西猫儿山自然保护区罗远周先生在野外采集工作中给予较多帮助。